



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส



สถานการณ์โรคติดต่อ ที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป)
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
ครั้งที่ 11/2568
วันที่ 25 ธันวาคม 2568

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ระดับประเทศ และจังหวัดนราธิวาส ข้อมูล 1 ม.ค. - 13 ธ.ค. 68


ประเทศ

โรค	ผู้ป่วย(ราย)	
ไข้หวัดใหญ่	1,127,498	01
อุจจาระร่วง	808,433	02
COVID-19	613,762	03
ปอดอักเสบ	436,155	04
อาหารเป็นพิษ	136,156	05
มือเท้าปาก	113,365	06
ไข้เลือดออก	56,156	07
ติดเชื้อไวรัสฮาร์เจส	47,686	08
สுகไส	46,213	09
ซีฟิลิส	31,241	10

จังหวัด นราธิวาส

โรค	ผู้ป่วย(ราย)
ไข้หวัดใหญ่	6,019
อุจจาระร่วง	4,892
ปอดอักเสบ	4,157
มือเท้าปาก	1,605
สுகไส	1,171
ไข้เลือดออก	733
ติดเชื้อไวรัสฮาร์เจส	536
COVID-19	493
อาหารเป็นพิษ	228
ไข้ไทฟอยด์	166





สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50 (16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

	โรค	อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	ผู้ป่วย(ราย)	ค่ามัธยฐาน(ราย)	เปรียบเทียบกับปี 68 กับค่ามัธยฐาน
01	ไข้หวัดใหญ่	118.34	976	191	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 410.99
02	อุจจาระร่วง	50.63	418	128	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 226.56
03	ปอดอักเสบ	36.50	301	326	ลดลง ร้อยละ 7.67
04	สุกใส	8.12	67	43	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55.81
05	ไข้เลือดออก	3.27	27	84	ลดลง ร้อยละ 67.86
06	ติดเชื้อไวรัสอาร์เอสวี	2.91	24	0 เริ่มมีระบบรายงานในปี 2568	-
07	อาหารเป็นพิษ	1.94	16	12	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 33.33
08	มือเท้าปาก	1.70	14	8	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 75.00
09	ไข้ไทฟอยด์	1.45	12	7	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 71.43
10	เลปโตสไปโรสิส	1.33	11	10	เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.00



ผู้ป่วยเลปโตสไปโรสิสเสียชีวิต 1 ราย

ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัล (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 19 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย



**สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47 - 50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกินค่ามาตรฐาน 5 ปี ย้อนหลัง**



สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

เฝ้าระวังกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี, 10-14 ปี

สถานที่เสี่ยง ศพด.,โรงเรียน

สอบสวนควบคุมโรค


- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนใน ชุมชนเดียวกัน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป
- ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง
- ฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง

โรคไข้หวัดใหญ่
รวมทั้งจังหวัด

จำนวนป่วย
976 ราย

อัตราป่วย118.34
ต่อประชากรแสนคน

ICD 10 : J10-11



อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน	
	ไม่มีรายงานผู้ป่วย
	ไม่เกิน 10.00
	10.01 – 50.00
	50.01 – 100.00
	มากกว่า 100.00

ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกินค่ามาตรฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

เฝ้าระวังกลุ่มอายุ 0-4 ปี, 5-9 ปี, 20-29 ปี

สถานที่เสี่ยง ศพด., โรงเรียน, ชุมชน

สอบสวนควบคุมโรค


- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนใน ชุมชนเดียวกัน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป
- ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง

โรคอุจจาระร่วง
จังหวัดนราธิวาส

จำนวนป่วย
418 ราย

อัตราป่วย 50.68
ต่อประชากรแสนคน

ICD 10 : A04.0-A04.9,A08.0-A08.5,A09.0-A09.9




สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกินค่ามาตรฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

เฝ้าระวังกลุ่มอายุ 5-9 ปี, 0-4ปี, 10-14 ปี


สถานที่เสี่ยง โรงเรียน

สอบสวนควบคุมโรค

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป
ในสถานที่เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยา ภายใน 21 วัน
- ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง



ICD 10 : B01.0-B01.2,B01.8-B01.9



ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกินค่ามาตรฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

เฝ้าระวังกลุ่มอายุ 5-9 ปี, 10-14 ปี, 60+ ปี

สถานที่เสี่ยง โรงเรียน, ชุมชน

สอบสวนควบคุมโรค


- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนใน ชุมชนเดียวกัน ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป
- ลงสอบสวนภายใน 24-48 ชั่วโมง หลังได้รับแจ้ง

โรคอาหารเป็นพิษ
จังหวัดนราธิวาส

จำนวนป่วย
16 ราย

อัตราป่วย 1.94
ต่อประชากรแสนคน

ICD 10 : A02 ; A02.0, A02.1, A02.2, A02.8, A02.9
A05 ; A05.0, A05.2-A05.4, A05.8-A05.9, A32.9



**สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกินค่ามาตรฐาน 5 ปี ย้อนหลัง**


0-4ű

ชุมชน, ศพด.

ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน

ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป ใน 1 สัปดาห์ จากสถานที่เดียวกัน

ICD 10 : B08.4,B08.5



ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

ที่มา ข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อ (DDS) กองระบาด กรมควบคุมโรค วันที่ 19 ธันวาคม 2568 วิเคราะห์ข้อมูลตามวันเริ่มป่วย

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกิดขึ้นมีรายงาน 5 ปี ย้อนหลัง

เฝ้าระวังกลุ่มอายุ 15-19 ปี, 20-24 ปี, 0-4 ปี

สถานที่เสี่ยง โรงเรียน, ชุมชน

สอบสวนควบคุมโรค


ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อนในชุมชนเดียวกัน
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป

โรคไข้ไทฟอยด์
จังหวัดนราธิวาส

จำนวนป่วย
12 ราย

อัตราป่วย 1.45
ต่อประชากรแสนคน

ICD 10 : A01.0



ตัวเลขในแผนที่แสดงจำนวนผู้ป่วย(ราย)

สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา จังหวัดนราธิวาส
ข้อมูล สัปดาห์ที่ 47-50
(16 พ.ย. - 13 ธ.ค. 68)
ที่เกินค่ามาตรฐาน 5 ปี ย้อนหลัง

- เฝ้าระวังกลุ่มอายุ 40-49 ปี, 30-39 ปี
- สถานที่เสี่ยง ชุมชน ,แหล่งน้ำท่วมขัง
- สอบสวนควบคุมโรค


- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในตำบลเดียวกัน ภายใน 1 เดือน
- ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย

โรคเลปโตสไปโรสิส
จังหวัดนราธิวาส

จำนวนป่วย
11 ราย

อัตราป่วย 1.33
ต่อประชากรแสนคน

ICD 10 : A27.0, A27.8, A27.9



ผู้ป่วยยืนยันโรคเลปโตสไปโรสิสเสียชีวิต

- เพศชาย
- อายุ 45 ปี
- อาชีพรับจ้างตัดไม้ยาง
- ตำบลแม่งดง อำเภอแวง จังหวัดนราธิวาส
- มีประวัติการแช่น้ำ ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ย. 68 ถึงวันที่ 2 ธ.ค. 68 บริเวณสวนปาล์มแถวบ้าน
- เข้ารับการรักษา วันที่ 3 ธ.ค. 68 มีอาการอาการไข้ ไอแห้ง เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามตัว ปวดท้อง
- ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เบื้องต้น ไม่ระบุพบเชื้อ Leptospira
- วันที่ 4 ธ.ค. 68 เวลา 11.00 น. ส่งรักษาโรงพยาบาลสุโขทัย และเสียชีวิตในเวลา 13.54 น.
- หมอวินิจฉัย Severe Leptospirosis c septic shock c Renal failure
- วันที่ 12 ธันวาคม 2568 ผลการตรวจจำเพาะ Leptospira IgM ผล Positive
- กำหนดจัดทำ Dead case conference วันที่ 29 ธ.ค.68

โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังหลังน้ำท่วม



โรคระบบ
ทางเดิน
หายใจ





โรคติดต่อ
นำโดยยุงลาย




โรคติดต่อ
จากสัตว์สู่คน




โรคจากการ
สัมผัส



มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค




- เฝ้าระวังผู้ป่วย ILI
- ลงพื้นที่ค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเมื่อพบสัญญาณผิดปกติ
- ส่งเสริมการฉีดวัคซีน
- ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรค




- เฝ้าระวังผู้ป่วยในชุมชน
- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย
- สำนวณ HI, CI
- สนับสนุนสารทากันยุง
- พ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัย

มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค



- เฝ้าระวังผู้ป่วย ใช้เฝ้ายามร่วมกับ ประวัติสัมผัสน้ำหรือโคลน ลงแช่น้ำหรืออาศัยในพื้นที่ท่วม
- ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
- พิจารณาการให้ยารักษาทันที



- เฝ้าระวังผู้ป่วย ใช้เฝ้ายาม+อาหาร เข้าได้กับติดเชื้อในกระแสเลือด+ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
- เฝ้าระวังเหตุการณ์ กลุ่มก้อนผู้ป่วยใช้ ไม่ทราบสาเหตุ
- ค้นหาผู้ป่วยในชุมชน ที่มีอาการใช้ไม่ทราบสาเหตุ ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง



THANK YOU