






ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR1 เกือบตก ในเด็กอายุครบ 2 ปี

1. เป้าหมายการดำเนินงาน **ฉีดครบ 100%** ของเป้าหมายรวมทุกไตรมาส **ก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2569**


พศจิกาย




ธันวาคม



เป้าต้องเก็บเพิ่มให้ครบ 100%



ธันวาคม



ข้อมูลจาก Narathiwat Health Data Center (HDC) ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2568



ตัวชี้วัดตรวจราชการ

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน MMR2 ในเด็กอายุครบ 2 ปี

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา

ภาพรวมตัวชี้วัด (KPI at a Glance)

ตัวชี้วัด (The KPI)

ร้อยละความครอบคลุมของวัคซีน MMR2
ในเด็กอายุครบ 2 ปี
ยุทธศาสตร์ PP & P Excellence

กลุ่มเป้าหมาย (Target Population)



เด็กไทยอายุครบ 2 ปี ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่

แหล่งข้อมูล (Data Source)



Health Data Center (HDC)
จากฐานข้อมูล 43 แห่ง

เป้าหมายสุดท้าย (Final Target)



ความครอบคลุม $\geq 95\%$
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เกณฑ์การประเมิน

70 %

ความครอบคลุม
MMR2 95 %

30 %

กระบวนการ งานคุณภาพ
6 Building Block

Building Block

1. การให้บริการสุขภาพ → การติดตามเด็กตกหล่นให้เข้ารับบริการวัคซีน MMR2 → ทะเบียนรายชื่อเด็กตกหล่น
2. กำลังคนที่ให้บริการ → การพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค → ผ่าน E-learning (GURU Vaccine)
3. ระบบงานและการจัดการข้อมูล → การกำกับติดตามการรายงานความครอบคลุม → รายงานถอดบทเรียนรายไตรมาส
4. การเข้าถึงยาช่วยชีวิตและอุปกรณ์ฉุกเฉิน → cold chain → คลังวัคซีน Self Assessment 1 ครั้ง/ปี
5. ภาวะผู้นำและธรรมาภิบาลระบบสุขภาพ → การขับเคลื่อนนโยบาย → 1. สรุปการประชุม คปสอ.(งานวัคซีน)
2. หนังสือ - คำสั่ง/เวียน/มอบหมายงาน)
- ~~6. การเงินการคลังด้านการให้บริการ~~

6 เดือน

มีนาคม 69

MMR2 80%

10 เดือน

กรกฎาคม 69

MMR2 95%



การรณรงค์การให้วัคซีนโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยงประจำปี 2568

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รอบที่ 1 วันที่ 14 มกราคม 2569

รอบที่ 2 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2569

หยอดให้เด็กไทยต่ำกว่า 5 ปี และเด็กต่างชาติอายุต่ำกว่า 15 ปี
เกณฑ์การประเมินร้อยละ 90 รายตำบล



กำหนดการ

กำหนดการรณรงค์

รอบที่ 1
14 มกราคม 2569

รอบที่ 2
18 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วยบริการ
ส่ง รง. FP5 ให้สสอ.

28 มกราคม 2569

4 มีนาคม 2569

สสอ.
ส่ง รง. FP6 ให้สส4.

4 กุมภาพันธ์ 2569

11 มีนาคม 2569

เฝ้าระวังการเกิด AFP

ข้อมูลจากแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเสริมในพื้นที่เสี่ยง พ.ศ. 2568 ของ กรมควบคุมโรค สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ <https://shorturl-ddc.moph.go.th/4JMIA> หรือ QR Code



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รายงานผู้ป่วยโปลิโอสายพันธุ์วัคซีนกลายพันธุ์ (VDPV) ในประเทศเพื่อนบ้าน

ปีที่พบผู้ป่วย	ประเทศที่พบผู้ป่วย	จำนวนผู้ติดเชื้อ		
		VDPV1	VDPV2	VDPV3
2558	เมียนมา	–	2	-
	สปป.ลาว	11	–	–
2561	อินโดนีเซีย	1	–	–
2562	เมียนมา	6	–	–
	มาเลเซีย	3	–	–
	ฟิลิปปินส์	2	12	-
2563	อินโดนีเซีย	1	–	–
	ฟิลิปปินส์	–	1	-
2565	อินโดนีเซีย	–	1	-
2566	อินโดนีเซีย	–	6	-
2567	อินโดนีเซีย	–	7	-
2568	เมียนมา	1	–	–
	สปป.ลาว	3	–	–



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

รายงานผู้ป่วยอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน (AFP) และความครอบคลุมของวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ จําแนกรายจังหวัด ปี 2568 (1 ม.ค. – 30 ก.ย.)

เขต	จังหวัด	เป้าหมายการ รายงานผู้ป่วย AFP อย่างน้อย ราย/ปี	จำนวนผู้ป่วย AFP ที่รายงาน ทั้งหมด (ราย)	อัตราการรายงานผู้ป่วย AFP (ต่อ 100,000 ประชากร อายุต่ำกว่า 15 ปี)	อัตราการรายงานผู้ป่วย AFP ที่ไม่ใช่โปลิโอ (ต่อ 100,000 ประชากร อายุต่ำกว่า 15 ปี)	ความครอบคลุม วัคซีน IPV**	ความครอบคลุม วัคซีน OPV3**
12	ตรัง	3	3	2.95	1.97	95.41	89.19
12	สงขลา	5	4*	1.62	1.21	90.82	86.69
12	ยะลา	3	1	0.75	0.75	65.26	62.83
12	ปัตตานี	4	1	0.55	0.55	49.94	43.68
12	พัทลุง	2	0	0.00	0.00	98.28	98.01
12	สตูล	2	0	0.00	0.00	95.81	92.72
12	นราธิวาส	4	0	0.00	0.00	60.34	49.38

หมายเหตุ : *อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

**ที่มา : ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ Health Data Center (HDC) <https://hdc.moph.go.th/center/public/standard-report-detail/>

ที่มา : รายงาน สถานการณ์โรค โปลิโอ (Poliomyelitis) ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2568 โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

แจ้งเตือนการลงข้อมูลการให้บริการวัคซีน Rota



การลงข้อมูลเมื่อมีการเปลี่ยนชนิดวัคซีน Rota

ชื่อและรหัสวัคซีนสำหรับใช้บันทึกและส่งออกข้อมูลการให้บริการวัคซีนโรค

ชื่อวัคซีน ภาษาอังกฤษ	ชื่อวัคซีน ภาษาไทย	รหัสวัคซีน	รหัสส่งออก	รหัส ICD-10- TM	อายุที่ได้รับ วัคซีน (เดือน)
วัคซีนชนิดหยอด 2 ครั้ง					
RV2-1	โรค 2-1	R11	R11	Z25.8	2 เดือน
RV2-2	โรค 2-2	R12	R12	Z25.8	4 เดือน
วัคซีนชนิดหยอด 3 ครั้ง					
RV3-1	โรค 3-1	R21	R21	Z25.8	2 เดือน
RV3-2	โรค 3-2	R22	R22	Z25.8	4 เดือน
RV3-3	โรค 3-3	R23	R23	Z25.8	6 เดือน

หากใช้แบบผสมให้คีย์ตามที่ให้จริง

เช่น ROTARIX + ROTASIIL + ROTASIIL

R11, โรค 2-1 (RV2-1)

R22, โรค 3-2 (RV3-2)

R23, โรค 3-3 (RV3-3)

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคำแนะนำสำหรับการดำเนินงานวัคซีนโรค (RotasiilTM) ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปี 2568

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค และ https://scm.gpo.or.th/vmi_next/nhso/epi1